КАК ЗАМЕДЛИТЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ РС?

УВИДЕТЬ ПЕРЕМЕНЫ РАНЬШЕ

По данным исследования средний возраст пациентов с признаками перехода из РС в ВПРС составляет 38 лет[3]*

НАЧНИТЕ ДИАЛОГ О ПРОГРЕССИИ РС С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ, ЧТОБЫ РАНЬШЕ ВЫЯВИТЬ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕДЛИТЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ[1,2,4]

Изображение не является реальной фотографией пациента. *Из наблюдательного исследования с участием 793 пациентов с РРС, из которых 593 получали ПИТРС. ПИТРС – препараты, изменяющие течение рассеянного склероза; РС – рассеянный склероз; ВПРС – вторично прогрессирующий рассеянный склероз; РРС – ремиттирующий рассеянный склероз.

1. Люблин, Рейнгольд, Коэн и соавторы. Определяя клиническое течение рассеянного склероза: пересмотр 2013 года (на англ.). Журнал «Неврология». 2014;83(3):278-286. 2. Земсен, Дерфусс, де Стефано и соавторы. Оптимизация успеха лечения рассеянного склероза (на англ.).. Журнал неврологии 2016;263(6):1053-1065. 3. Бстех, Эхлинг, Лютеротти и соавторы. Долгосрочные клинические прогностические факторы при ремиттирующем рассеянном склерозе: результаты 10-летнего исследования (на англ.).. Журнал PLoS ONE. 2016;11(7):e0158978. doi:10.1371/journal.pone.0158978. 4. Гросс, Ватсон. Характеристики, бремя болезни и физическое состояние пациентов с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом: перекрестное исследование в США (на англ.). Журнал «Лечение нейропсихических расстройств» 2017;13:1349-1357.

Данный материал не является рекомендацией к лечению и не подменяет собой консультацию специалиста. Для получения квалифицированной медицинской консультации или помощи обратитесь к своему лечащему врачу. Материал подготовлен при финансовой поддержке ООО «Новартис Фарма». ООО «Новартис Фарма», 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 70, тел.: +7 (495) 967 12 70, факс: +7 (495) 967 12 68. www.novartis.ru

11407101/SIP/module/04.25/0